

References

1. Pimlott N. For family physicians, by family physicians? *Can Fam Physician* 2016;62:699 (Eng), 700 (Fr).
2. Allan GM. Should primary care guidelines be written by family physicians? Yes [Debates]. *Can Fam Physician* 2016;62:705-6 (Eng), 708-10 (Fr).
3. College of Family Physicians of Canada. *Four principles of family medicine*. Mississauga, ON: College of Family Physicians of Canada; 2006. Available from: www.cfp.ca/principles. Accessed 2016 Oct 3.

Correction

In the article "Euglycemic diabetic ketoacidosis in type 2 diabetes treated with a sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor," which appeared in the September issue of *Canadian Family Physician*,¹ there was an error in the opening paragraph. The first 2 sentences should have read as follows:

More than 10 million Canadians are currently living with diabetes or prediabetes. Of those with diabetes, 90% have type 2 diabetes mellitus (T2DM).

We apologize for the error and any confusion it might have caused.

Reference

1. Jazi M, Porfiris G. Euglycemic diabetic ketoacidosis in type 2 diabetes treated with a sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor. *Can Fam Physician* 2016;62:722-4 (Eng), e514-7 (Fr).

Correction

Une erreur s'est glissée dans le paragraphe d'introduction de l'article intitulé «L'acidocétose euglycémique dans le diabète de type 2 traité avec un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2» publié dans le numéro de septembre du *Médecin de famille canadien*¹. Les 2 premières phrases auraient dû se lire comme suit:

Plus de 10 millions de Canadiens vivent actuellement avec le diabète ou un prédiabète. Parmi les personnes diabétiques, 90% ont un diabète de type 2 (T2DM).

Nous nous excusons de cette erreur et de toute confusion qu'elle aurait pu causer.

Référence

1. Jazi M, Porfiris G. L'acidocétose euglycémique dans le diabète de type 2 traité avec un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2. *Can Fam Physician* 2016;62:722-4 (ang), e514-7 (fr).

