

## Correction

In the article “Reducing the environmental burden of unnecessary investigations,”<sup>1</sup> which appeared in the February 2025 issue of *Canadian Family Physician*, **Table 1** on page 83 was inadvertently labelled as **Table 2**.

The online version of this article has been corrected.

### Référence

1. Hale I, Green S. Reducing the environmental burden of unnecessary investigations. *Can Fam Physician* 2025;71:80-4 (Eng), 91-6 (Fr).

*Can Fam Physician* 2025;71:155. DOI: 10.46747/cfp.7103155

## Correction

Dans l'article « Réduire le fardeau environnemental des examens inutiles »<sup>1</sup>, paru dans le numéro de février 2025 du *Médecin de famille canadien*, le **Tableau 1** de la page 95 a été étiqueté par inadvertance comme étant le **Tableau 2**.

La version en ligne de cet article a été corrigée.

### Référence

1. Hale I, Green S. Réduire le fardeau environnemental des examens inutiles. *Can Fam Physician* 2025;71:80-4 (ang), 91-6 (fr).

*Can Fam Physician* 2025;71:155. DOI: 10.46747/cfp.7103155\_1

## Correction

Dans l'article intitulé « Traitement de l'insomnie chronique chez les adultes »<sup>1</sup>, paru dans le numéro de mars 2024 du *Médecin de famille canadien*, une phrase a été omise par inadvertance du deuxième paragraphe à la page 181. Le paragraphe aurait dû se lire comme suit :

**Déprescrire les sédatifs.** Étant donné les nombreux effets indésirables des sédatifs, qui ont été bien documentés, ces médicaments devraient

être utilisés avec prudence pour le traitement de l'insomnie chronique. Par ailleurs, un petit groupe de patients peuvent avoir besoin d'un sédatif d'appoint en plus de la thérapie non pharmacologique pour suivre l'adage « commencer lentement et sevrer rapidement ». Dans certains cas, il peut être approprié de conclure un marché avec le patient selon lequel vous lui prescrivez un sédatif à faible dose pour une période limitée et vous établissez un plan précis pour sa cessation. Pour certains patients qui prennent des sédatifs depuis longtemps, il faut prévoir l'amorce de conversations sur la déprescription, et répondre à leurs préoccupations et à leurs craintes; une brochure à l'intention des patients est accessible auprès de **Deprescribing.org**<sup>30</sup>. De tels patients devront être sevrés graduellement des sédatifs, sous supervision médicale pour éviter des symptômes de sevrage ou l'aggravation de l'insomnie. Un guide utile et fondé sur des données probantes sur la déprescription de sédatifs a été publié en 2018, et son algorithme de déprescription est disponible sous la forme d'un document séparé auprès de **Deprescribing.org**<sup>31,32</sup>.

La version en ligne de l'article a été corrigée.

### Référence

1. Clarke K, Orlov N, Soong C. Traitement de l'insomnie chronique chez les adultes. *Can Fam Physician* 2024;70:176-8 (ang), 179-82 (fr).

*Can Fam Physician* 2025;71:155. DOI: 10.46747/cfp.7103155\_2